12 DUBTES SOBRE EL VIRUS VIH

EL VIH NO DISCRIMINA. TOTS SOM VULNERABLES. PROTEGEIX-TE

SÍ es transmet per:

1.

Mantenir relacions sexuals amb penetració anal o vaginal sense preservatiu. En el sexe oral també hi ha risc de transmissió del VIH.

2.

Tenir altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) incrementa el risc de tenir el VIH.

3.

Per compartir xeringues, agulles, altre material d'injecció o qualsevol cosa que pugui tallar o punxar i que hagi estat en contacte amb sang infectada.

4.

D'una mare al seu nadó durant l'embaràs, durant el part o la lactància.

NO es transmet per:

1.

Conviure amb persones que tinguin el virus. Els petons, les carícies, donar-se la mà, tocar-se o masturbar a la teva parella.

2.

Compartir objectes d'ús comú, com la roba, aliments, dutxes, lavabos, espais de treball, col·legis, residències o llocs públics, entre d'altres.

3.

Mossegades o picades d'animals o mosquits.

4.

Donar o rebre sang en països on no hi ha un control adequat.

Es pot PREVENIR si:

1.

Utilitzes el preservatiu, masculí o femení, en les relacions sexuals amb penetració i evites l'ejaculació a la boca.

2.

No comparteixes xeringues, agulles, fulles d'afaitar, raspalls de dents i altres útils per perforar la pell (arracades, pírcings, material de tatuatge,...).

3.

No dones el pit per alimentar el teu nadó. Una persona amb VIH tractada pot tenir un embaràs i un part sense problemes i el seu nadó néixer sense VIH.

4.

La persona que té el VIH està en tractament. El risc de transmissió és molt baix i la seva càrrega viral és indetectable.

Quan fer-me la prova?

- Si has mantingut relacions sexuals sense preservatiu i no t'has fet la prova amb anterioritat.
- Si sospites que pots estar embarassada o vols tenir un fill.
- Si has tingut alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis viral.
- Si has tingut alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis viral.
- Si has compartit material per injectar-te drogues (xeringues, agulles, culleres, filtres ...) o has fet servir material sense esterilitzar per perforacions en pell o mucoses (arracades, pírcing, tatuatges...).

Què és la Profilaxi Post Exposició?

28d

Aquesta mesura consisteix a prendre **medicació antiretroviral durant 28 dies després d'una possible exposició al VIH** per reduir el risc d'infecció.

72h

Hi ha un marge d'entre **6 i 72 hores des de l'exposició al VIH per acudir al servei d'urgències** i que el personal sanitari valori cada cas particular.

PortalCLÍNIC

CLÍNIC BARCELONA Hospital Universitari | Fundación BBVA

www.hospitalclinic.org

Abril de 2016. Portal Clínic
Aquest material té llicència Creative Commons