


# TRATAMIENTO CON FINGOLIMOD

## Posología:



Tomar 1 comprimido al día, con o sin alimentos, preferentemente por la mañana.


## Efectos secundarios:



**Ritmo cardíaco lento.** El día que tome el fármaco por primera vez deberá permanecer durante 6 horas en el hospital, para vigilancia del ritmo cardíaco. El resto de días no debe tener ninguna precaución especial, pero puede que se sienta mareado o cansado. Al cabo de 1 mes el ritmo cardíaco se normaliza.



**Edema macular.** La mácula es una pequeña zona de la retina que podría inflamarse. Deberá realizarse una revisión oftalmológica, y además deberá notificar al médico cualquier cambio en su visión.




**Disminución de los glóbulos blancos,** por lo que puede contraer infecciones más fácilmente. Para controlarlo, se realizará análisis periódicamente.




**Alteración hepática.** También se irá controlando mediante análisis de sangre.

## Precauciones:




No se recomienda su uso en el embarazo. Durante el tratamiento y hasta 2 meses después de interrumpirlo, debe evitar quedarse embarazada.


## Precauciones:



No tomar Fingolimod en caso de inmunodeficiencia, si tiene una infección grave, o si padece algún cáncer.



Durante el tratamiento y hasta 2 meses después de su interrupción, no deberán administrarle vacunas de virus vivos atenuados: BCG, triple vírica, polio oral, varicela, fiebre amarilla, antitifoidea oral y anticolérica.




Se habrá de repetir la vigilancia del ritmo cardíaco en el hospital, si se interrumpe el tratamiento:

- 1 día o más, durante las 2 primeras semanas
- más de 7 días, durante las semanas 3 y 4
- más de 2 semanas a partir de 1 mes de tratamiento.

## Interacciones:

### Medicamentos contraindicados:

1. Medicamentos de la clase 1A ( disopiramida, procainamida, quinina) y de la clase 3 (amiodarona, sotalol, bretilio y nibentan).
2. Antineoplásicos.
3. Inmunosupresores o inmunomoduladores.



### Medicamentos con los que se deberá tener precaución:

1. Betabloqueantes
2. Bloqueantes de los canales de calcio (verapamilo y diltiazem).
3. Digoxina.
4. Agentes colinesterásicos.
5. Pilocarpina.
6. Inhibidores de proteasas.
7. Antifúngicos azoles.
8. Algunos antibióticos macrólidos, como claritromicina o telitromicina.