

TRATAMIENTO CON TERIFLUNOMIDA

Posología:




Tomar 1 comprimido al día, con o sin alimentos.
Si ha olvidado tomar una dosis, tómelas lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.

Efectos secundarios:




Afinamiento o caída leve del cabello. Suele remitir a los 6 meses.



Elevación de la tensión arterial, por lo que tendrá que controlarla regularmente.



Molestias intestinales, como flatulencia, mayor frecuencia y deposiciones más blandas, o excepcionalmente diarrea.



Alteraciones del hemograma, perfil hepático y perfil pancreático, por lo que deberá realizarse análisis de sangre:


- **Primeros 6 meses:** cada 2 semanas.
- **A partir de los 6 meses:** cada 2 meses, posteriormente según criterio médico

Precauciones:



Si utiliza anticonceptivos orales, debe consultar con su ginecólogo la posibilidad de interacción con Teriflunomida.

El fármaco puede afectar al feto, tanto si es hombre como si es mujer, por lo que debe eliminarse del organismo mediante medicación antes del embarazo. Consulte con su médico para planificar el embarazo.



Debe evitarse el uso de vacunas de virus vivos atenuados: BCG, triple vírica, polio oral, varicela, fiebre amarilla, antitifoidea oral y anticolérica.

Interacciones con otros fármacos:



Antibióticos: rifampicina, cefaclor, penicilina G, ciprofloxacino.

Antiinflamatorios: indometacina, ketoprofeno, sulfasalazina.

Hipotensores: furosemida.

Hipolipemiantes: rosuvastatina (se aconseja reducir la dosis a la mitad), simvastatina, atorvastatina, pravastatina.

Protector gástrico: cimetidina.

Inmunosupresores/Antineoplásicos: metotrexate, ciclosporina, daunorubicina, doxorubicina, topotecan, gefitinib, paclitaxel.

Antiretrovirales: zidovudina.

Antidiabéticos orales: nateglinida, repaglinida, pioglitazona o rosiglitazona.

Algunos **anticonceptivos orales.**

Hemostáticos: eltrombopag, warfarina.

Antiepilépticos: carbamacepina, fenobarbital, fenitoína.

Antiasmáticos: teofilina.

Antidepresivos: duloxetina, alosentron.

Antiespásticos: tizanidina.

Otros: hierba de San Juan.