


TRATAMIENTO CON INTERFERON BETA 1A INTRAMUSCULAR

Posología:



1 inyección subcutánea 1 vez por semana (siempre el mismo día de la semana).


Recomendaciones generales:



- Transportar la medicación en frío (neveras portátiles) y guardarlo en la nevera de casa cuando llegue. No congelar. Puede mantenerse hasta 1 mes a temperatura no superior a 25° C.
- No inyectar la medicación fría, sacarla de la nevera al menos 1h antes.



- Lavarse las manos y la zona a inyectar con agua y jabón. No es necesario usar alcohol ni otros desinfectantes, pues resecan la piel.



- No inyectar en zonas con estrías, lunares, varices, tatuajes, cicatrices o ulceraciones.
- La zona a inyectar son la parte externa de los muslos. Esta debe estar bien relajada, no pincharse sobre un músculo en tensión.
- Pincharse mediante el autoinyector, alternando ambos muslos.



- No masajear la zona tras la inyección, sólo aplicar una presión con el dedo durante unos segundos. Es normal que salga una gotita de sangre o de líquido.

Posibles reacciones cutáneas en el lugar de la inyección:



Ocasionalmente, puede parecer un hematoma en el lugar de la inyección. Si es extenso puede aplicar pomada Trombocid.

No son frecuentes otro tipo de reacciones. En caso de dolor intenso o persistente, ulceraciones, costras o supuración en el lugar de inyección, contacte con su equipo médico.

Qué es el síndrome pseudogripal?

Es una reacción normal de nuestro organismo durante las horas siguientes a la inyección. Este puede manifestarse mediante fiebre, cefalea, dolor en las articulaciones, cansancio o malestar general. Estos síntomas suelen acusarse al principio y van disminuyendo con el tiempo.

Se aconseja:

Administrar la inyección por la noche y tomar un ibopropeno de 600 mg antes de la inyección. Es importante seguir el escalado de dosis propio de cada fármaco, tal como se le ha indicado.

