

TRACTAMENT AMB ACETAT DE GLATIRÀMER

Posologia:



1 injecció subcutània 3 vegades per setmana, en dies no consecutius. Per ex.: dilluns, dimecres i divendres o dimarts, dijous i dissabte o dimarts, dijous i diumenge.


Recomanacions generals:



- Transportar la medicació en fred (neveres portàtils) i, quan arribi a casa, guardar-la a la nevera. No congelar.
- No injectar la medicació freda. Treure-la de la nevera unes quantes hores abans.



- Rentar-se les mans i la zona a injectar amb aigua i sabó. No és necessari usar alcohol ni altres desinfectants, ja que ressequen la pell.



- No injectar en zones amb estries, pigues, varices, tatuatges, cicatrius o ulceracions.
- La zona a injectar ha d'estar ben relaxada, no punxar-se sobre un múscul en tensió.
- Pot punxar-se manualment o mitjançant l'autoinjectable.
- Punxar-se cada dia en una zona diferent de les 8 que se li indiquen en l'esquema adjunt.



30 MIN

- No fer massatges a la zona després de la injecció, només fer pressió amb el dit durant uns segons. És normal que surti una goteta de sang o de líquid.
- No aplicar fred local ni cremes just abans o després de la injecció; esperar almenys 30 minuts.

Com alleujar les possibles reaccions cutànies de la zona de la injecció

La millor manera de prevenir-les és una bona tècnica i una correcta rotació per totes les zones d'injecció.

Pot aparèixer:

Pot aplicar:

Enrogiment



Fred local / Gel d'àloe vera / Crema de calèndula / Aigua de Bürow (aplicar, dues vegades al dia, unes gases xopades i deixar actuar 10 minuts).

Dolor/
Imflamació



Fred local / Gel d'àloe vera / Gel d'arnica, i a més, haurà de reduir la profunditat de la injecció.

Faves/ Picor



Augmentar la profunditat de la injecció i, si no millora, aplicar Adventan pomada (2 vegades al dia) / Cremes hidratants.

Induració



Calor local mitjançant estoreta o bossa de gel, durant 10 min, dues vegades al dia, i alternar amb crema anticel·lulítica. No injectar-se en una zona amb induracions.

Hematoma



No aplicar res o pomada Trombocid.

En cas de dolor intens o persistent, ulceracions, crostes o supuració a la zona d'injecció, contacti amb el seu equip mèdic.

Com actuar davant la síndrome toràcica immediata a la injecció:

Consisteix en una sensació d'opressió al pit, dificultat per a respirar i palpitations. És una reacció molt poc freqüent, que pot ocórrer just després de la injecció, i es resol per si sola en pocs minuts.

S'aconsella:

Asseure's o estirar-se, intentar relaxar-se, controlant les respiracions i esperar que desapareguin els símptomes, normalment en uns 15 minuts.

