


TRATAMIENTO CON ACETATO DE GLATIRAMERO

Posología:



1 inyección subcutánea 3 veces por semana, en días no consecutivos.
Por ej: Lu-Mi-Vi, o Ma-Ju-Sa, o Ma-Ju-Do.


Recomendaciones generales:



- Transportar le medicación en frío (neveras portátiles) y guardarlo en la nevera de casa cuando llegue. No congelar.
- No inyectar la medicación fría, sacarla de la nevera varias horas antes.



- Lavarse las manos y la zona a inyectar con agua y jabón. No es necesario usar alcohol ni otros desinfectantes, pues resecan la piel.



- No inyectar en zonas con estrías, lunares, varices, tatuajes, cicatrices o ulceraciones.
- La zona a inyectar debe estar bien relajada, no pincharse sobre un músculo en tensión.
- Pincharse cada día en una zona distinta, de las que se le indican en el esquema.
- Puede pincharse manualmente o mediante el autoinyector.



30 MIN

- No masajear la zona tras la inyección, sólo aplicar una presión con el dedo durante unos segundos. Es normal que salga una gotita de sangre o de líquido.
- No aplicar frío local ni cremas justo antes ni después de la inyección; esperar al menos 30 minutos.

Cómo aliviar las posibles reacciones cutáneas en el lugar de la inyección:

La mejor manera de prevenirlas es una buena técnica de inyección y una correcta rotación por todas las zonas de inyección.

Puede aparecer:

Enrojecimiento



Puede aplicar:

Frio local / Gel de aloe vera / Crema de caléndula / Agua de Burow (aplicar gasas empapadas y dejar actuar 10 mins. dos veces al día)

Dolor/
Inflamación



Frío local / Gel de aloe vera / Gel de árnica, y además, deberá reducir la profundidad de la inyección

Habón/
Picor



Aumentar la profundidad de la inyección y, si no mejora, aplicar Adventan pomada (2 veces al día) / Cremas hidratantes

Induración



Calor local, mediante esterilla o bolsa de gel, durante 10 min. dos veces al día, y alternar con crema anticelulítica. No inyectarse en una zona indurada

Hematoma



No aplicar nada o pomada Trombocid

En caso de dolor intenso o persistente, ulceraciones, costras o supuración en el lugar de la inyección, contacte con su equipo médico.

Cómo actuar ante el síndrome torácico inmediato a la inyección:

Es una sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y palpitations. Esta reacción es poco frecuente, puede ocurrir justo después de la inyección y se resuelve por sí sola en pocos minutos.

Se aconseja:

Sentarse o estirarse, intentar relajarse y controlando las respiraciones. Esperar a que desaparezcan los síntomas, en unos 15 minutos.

