


TRATAMIENTO CON INTERFERON BETA 1B

Posología:



1 inyección subcutánea cada 48 horas. Una semana será : Lu- Mi-Vi-Do, y la siguiente Ma-Ju-Sa.

Es necesario iniciar el tratamiento con escalado de dosis. La primera semana el 25% de la dosis total, la segunda el 50%, la tercera, el 75% y la cuarta, dosis completa.


Recomendaciones generales:



- No es necesario conservar el medicamento en la nevera.
-



- Lavarse las manos y la zona a inyectar con agua y jabón. No es necesario usar alcohol ni otros desinfectantes, pues resecan la piel.
-



- La zona a inyectar debe estar bien relajada, no pincharse sobre: músculo en tensión, estrías, pecas, varices, tatuajes, cicatrices o ulceraciones
 - Diluir el vial y cargar la jeringa, tal como se le ha indicado.
 - Puede pincharse manualmente o mediante el autoinyector, cada día en una zona distinta, de las que se le indican en el esquema.
-



30 MIN

- No masajear la zona tras la inyección, sólo aplicar una presión con el dedo durante unos segundos. Es normal que salga una gotita de sangre o de líquido.
- No aplicar frío local ni cremas justo antes ni después de la inyección; esperar al menos 30 minutos.

Cómo aliviar las posibles reacciones cutáneas en el lugar de la inyección:

La mejor manera de prevenirlas es una buena técnica de inyección y una correcta rotación por todas las zonas de inyección.

Puede aparecer:

Puede aplicar:

Enrojecimiento



Frio local / Gel de aloe vera / Crema de caléndula /
Agua de Burow (aplicar gasas empapadas y dejar actuar 10 mins.
dos veces al día)

Dolor/
Inflamación



Frío local / Gel de aloe vera / Gel de árnica, y además, deberá
reducir la profundidad de la inyección

Picor



Adventan pomada (2 veces al día) / Cremas hidratantes

Induraciones



Calor local, mediante esterilla o bolsa de gel, durante 10 min. dos
veces al día, y alternar con crema anticelulítica.
No inyectarse en una zona indurada

Hematoma



No aplicar nada o pomada Trombocid

En caso de dolor intenso o persistente, ulceraciones, costras o supuración en el lugar de la inyección, contacte con su equipo médico.

Qué es el síndrome pseudogripal?

Es una reacción normal de nuestro organismo durante las horas siguientes a la inyección. Este puede manifestarse mediante fiebre, cefalea, dolor en las articulaciones, cansancio o malestar general. Estos síntomas suelen acusarse al principio y van disminuyendo con el tiempo.

Se aconseja:

Administrar la inyección por la noche y tomar un ibuprofeno de 600 mg antes de la inyección. Es importante seguir el escalado de dosis propio de cada fármaco, tal como se le ha indicado.

